

# AVERTISSEMENTS

# AGRICOLLES®

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

EDITION BAS-VIVARAIS

ABONNEMENT ANNUEL: 110f

REGISSEUR RECETTES D.D.A.F.



RÉGION RHÔNE-ALPES 55, rue Mazenod 69426 LYON CÉDEX 03

07 avril 1986

N° de série continue 117

Bulletin n° 7

## ARBORICULTEURS : A LA FLORAISON ATTENTION AUX ABEILLES

N'intervenez qu'en cas de nécessité avec une spécialité autorisée, et en dehors des heures de butinage

Le fluvalinate (KLARTAN) est à ajouter dans la liste des insecticides autorisés pendant la floraison

CERISIER : **Chancre bactérien** : pensez au 2ème traitement  
**Monilia** : la protection débutera au stade D-E  
**Chenilles défoliatrices** : surveillez-les  
PECHER : **Monilia** : protégez toute la floraison  
**Oïdium** : un 2ème traitement au stade G-H dans les vergers sensibles  
**Thrips** : une intervention de base à la fin de la chute des pétales  
PRUNIER : **Monilia** : protégez la floraison  
POIRIER-POMMIER : attention à la **Tavelure**  
**Capua** : les chenilles hivernantes sont dans les bouquets  
POMMIER : **Oïdium** : pensez à la protection pré-florale  
**Puceron cendré** : éliminez-le avant la floraison  
TOUS ARBRES FRUITIERS : **Acarie** dernière limite pour utiliser clofentézine  
FRAISIER : **Botrytis** : c'est le début de la protection

## ARBRES FRUITIERS

**CERISIER** : Le stade D est atteint en région précoce

**CHANCRE BACTERIEN** : au stade D, la 2ème intervention de printemps  
En verger sensible ou attaqué, utilisez une bouillie dosée à 250 g de cuivre métal/hl en mouillant abondamment.

**MONILIA** : la sensibilité des fleurs débute au stade D-E  
Elle dépendra des conditions climatiques et de l'inoculum présent dans le verger (chancres à Monilia, momies) ou à proximité.  
Pendant toute la période de sensibilité, du stade D-E à la chute des pétales, protégez vos vergers par 2 à 3 interventions suivant les risques.

Produits utilisables : les mêmes que ceux cités pour le pêcher.

**CHENILLES DEFOLIATRICES** : Pas de traitement systématique

Si vous observez leur présence fréquente, ajoutez phosalone à 60 g ma/hl (AZOPHENE, ZOLONE) au 1er traitement anti-monilia.

**PECHER** : Prochainement le début de la chute des pétales

**MONILIA** : Temps humide, risques importants. Ne relâchez pas la protection

**OÏDIUM** : En verger sensible, intervenez à la fin de la chute des pétales



D Les boutons se séparent.



E On voit les étamines.